| | | N children/adults | OR (95% CI) |
|---|---|---|---|
| Any V60L variants | OR confirmed diagnosis (a) | 42/145 | 1.06 (0.47, 2.42) |
| | OR all patients (b) | 137/540 | 1.60 (1.05, 2.44) |
| | Corrected OR (c) | 137/540 | 1.83 (1.14, 2.94) |
| Any D84E variants | OR confirmed diagnosis (a) | 19/66 | 1.77 (0.10, 30.12) |
| | OR all patients (b) | 63/284 | 1.03 (0.23, 4.72) |
| | Corrected OR (c) | 63/284 | 1.05 (0.30, 25.98) |
| Any V92M variants | OR confirmed diagnosis (a) | 27/88 | 1.86 (0.57, 6.05) |
| | OR all patients (b) | 90/385 | 1.39 (0.80, 2.41) |
| | Corrected OR (c) | 90/385 | 1.54 (0.80, 2.94) |
| Any R142H variants | OR confirmed diagnosis (a) | 18/75 | NC |
| | OR all patients (b) | 67/304 | 1.37 (0.51, 3.67) |
| | Corrected OR (c) | 67/304 | 1.52 (0.59, 9.50) |
| Any R151C variants | OR confirmed diagnosis (a) | 29/108 | 1.56 (0.52, 4.65) |
| | OR all patients (b) | 90/412 | 1.16 (0.65, 2.05) |
| | Corrected OR (c) | 90/412 | 1.22 (0.71, 2.69) |
| Any I155T variants | OR confirmed diagnosis (a) | 19/68 | 1.57 (0.09, 27.54) |
| | OR all patients (b) | 64/288 | 1.16 (0.34, 3.97) |
| | Corrected OR (c) | 64/288 | 1.22 (0.41, 9.49) |
| Any R160W variants | OR confirmed diagnosis (a) | 25/92 | 0.85 (0.21, 3.33) |
| | OR all patients (b) | 81/363 | 0.97 (0.49, 1.93) |
| | Corrected OR (c) | 81/363 | 0.96 (0.42, 2.86) |
| Any R163Q variants | OR confirmed diagnosis (a) | 18/80 | NC |
| | OR all patients (b) | 73/329 | 1.06 (0.49, 2.31) |
| | Corrected OR (c) | 73/329 | 1.09 (0.55, 4.43) |
| Any D294H variants | OR confirmed diagnosis (a) | 22/80 | 1.75 (0.28, 10.83) |
| | OR all patients (b) | 79/324 | 2.15 (1.05, 4.40) |
| | Corrected OR (c) | 79/324 | 2.59 (1.37, 6.00) |